






TEST DOJRZAŁOŚCI




TEST DOJRZAŁOŚCI












Będzie dobrze.
To na pewno jest do ogarnięcia.







mhm...

Jeżeli test anti-HCV wykaże, że organizm miał kontakt z wirusem, wykonuje się dodatkowe badanie, które ma sprawdzić obecność wirusa. Dodatni wynik testu oznacza przewlekłe zakażenie.



Jak tata robił to badanie i wynik jest dodatni, to znaczy, że jest chory?



Łatwo ci mówić „nie panikuj”...

Janek, nie panikuj. Wtedy trzeba będzie przeprowadzić kolejne badania, które pozwolą ustalić, jaki jest stan jego wątroby.



Janek, bądź dobrej myśli, najpierw porozmawiaj z tatą. Wszystko będzie ok.



A, i ważne jest, żebyście zachowali ostrożność i przez przypadek nie skorzystali z tych samych szczoteczek do zębów, maszynki do golenia – wszystkich przedmiotów, które mogły mieć bezpośredni kontakt z krwią.


Czemu się uśmiechasz?




To akurat już wiem.

I pamiętaj, porozmawiaj z rodzicami. Niech umówią się na spotkanie z...









HCV • WAŻNE INFORMACJE

JAK MOŻNA ZAKAŻIĆ SIĘ WIRUSEM HCV?

Do zakażenia dochodzi, gdy krew wejdzie w bezpośredni kontakt z krwią osoby zakażonej.

SYTUACJE, W KTÓRYCH MOŻE DOJŚĆ DO ZAKAŻENIA:

- transfuzje krwi lub produktów krwiopochodnych wykorzystujących skażoną krew (przed 1992 r.)
- używanie skażonych słomek, igieł lub materiałów do wstrzykiwania, współdzielonych z innymi
- seks bez zabezpieczenia z osobą zakażoną HCV, jeśli dojdzie do kontaktu krwi z krwią
- zabiegi medyczne, chirurgiczne i stomatologiczne wykonywane niedostatecznie wysterylizowanym sprzętem
- nieostrożny manicure/pedicure (gdy wystąpiło krwawienie) z użyciem nieodpowiednio wysterylizowanych narzędzi (bardzo rzadko)
- kolczykowanie i tatuowanie lub zabiegi akupunktury z użyciem nieodpowiednio wysterylizowanych narzędzi
- użyczenie przedmiotów osobistego użytku, np. szczoteczki do zębów, maszynki do golenia
- transmisja wirusa przy porodzie, z matki zakażonej WZW typu C (bardzo rzadko)

W GRUPIE RYZYKA ZAKAŻENIA WIRUSEM HCV MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ OSOBY, KTÓRE:

- miały przetaczaną krew przed 1992 rokiem
- były hospitalizowane przynajmniej 3 razy w ciągu swojego życia
- w przeszłości miały wykonywane zabiegi medyczne, chirurgiczne lub stomatologiczne
- miały kontakty seksualne bez zabezpieczenia
- miały kiedykolwiek stwierdzoną podwyższoną aktywność aminotransferaz (ALAT/AspAT)
- korzystały z zabiegów kosmetycznych, takich jak np. manicure, piercing lub tatuaż, wykonanych niesterylnym sprzętem
- przyjmowały narkotyki dożylnie lub donosowo

JAK SPRAWDZIĆ, CZY JEST SIĘ ZAKAŻONYM WIRUSEM HCV?

1

Test anty-HCV – proste badanie diagnostyczne krwi.

Pozwala stwierdzić, czy mieliśmy kontakt z wirusem HCV. Jego dodatni wynik wskazuje jedynie, że mieliśmy kontakt z wirusem, nie oznacza jednak, że jesteśmy zakażeni.

2

Badanie HCV RNA – badanie, które wykonuje się, aby sprawdzić, czy materiał genetyczny wirusa jest obecny we krwi. Jeżeli HCV RNA zostanie wykryte we krwi, wskazuje to na wirusowe zapalenie wątroby typu C.

abbvie

AbbVie Polska Sp. z o.o.
Ul. Postępu 21 B
02-676 Warszawa

PLHCVI70354

Wersja online:



www.gwiazdanadziei.pl/hcv-komiks.pdf

Patronat nad publikacją objęty:

